

Očkovací kalendář pro dospělé

● doporučeno všem v daném věku

○ doporučeno v případě rizikových faktorů

Rizikové faktory mohou zahrnovat: chronická onemocnění, poruchu imunity a další vážné zdravotní problémy; těhotenství; vyšší věk; rizikové chování a práci v riziku.

Nemoci	Typy nemocí	Věk					Vakcíny	Poznámka
		18–26 let	27–49 let	50–59 let	60–64 let	65+ let		
Tetanus		přeočkování po 10–15 letech			přeočkování po 10 letech		TETANOL PUR, TETAVAX	také při poranění
Černý kašel		min. 1 dávka 1× za život, přeočkování po 10–15 letech					BOOSTRIX, ADACEL	při kontaktu s dětmi do 1 roku, těhotné ženy, lze spojit s očkováním proti tetanu
Žloutenka	typ A	2 dávky					VAQTA, AVAXIM, HAVRIX	pro vnímavé a neočkované v dětství, rizikové skupiny a při rizikovém chování
	typ A+B	3 dávky					TWINRIX	
	typ B	3 dávky					ENGERIX-B, FENDRIX	
Chřipka		1 dávka, přeochkování každý rok					IDFlu, INFLUVAC, VAXIGRIP, OPTAFLU	zdravé osoby, rizikové skupiny a při práci v riziku
Pneumokokové nákazy		1 dávka konjugované vakcíny bez přeochkování nebo 1 dávka polysacharidové vakcíny s 1 přeochkováním po 5 letech			1 dávka konjugované + 1 dávka polysacharidové vakcíny		PREVENAR 13 (konjugovaná vakcína), PNEUMO 23 (polysacharidová vakcína)	rizikové skupiny a osoby ve vyšším věku
Rakovina děložního čípku		3 dávky					SILGARD (muži i ženy), CERVARIX (jen ženy)	pro neočkované v dětství
Pásový opar					1 dávka		ZOSTAVAX	doporučuje se co nejdříve
Plané neštovice		2 dávky					VARILRIX	osoby bez historie nemoci nebo séronegativní, rizikové skupiny a při práci v riziku
Klíšťová encefalitida		3 dávky, 1. přeochkování po 3 letech, pak po 5 letech			3 dávky, přeochkování po 3 letech		FSME-IMMUN, ENCEPUR	rizikové skupiny a při práci v riziku
Meningokokové nákazy	skupiny A, C, W135, Y	1–2 dávky, přeochkování po 5 letech					MENVEO, NIMENRIX	rizikové skupiny, při práci v riziku, cestovatelé
	skupina B	1–2 dávky					BEXSERO	
Hemofilové nákazy	typ b	1 dávka					HIBERIX	rizikové skupiny
Vzteklina		5 dávek postexpozičně nebo 3 dávky preexpozičně, přeochkování po 2–5 letech					VERORAB	při práci v riziku, od roku 2002 se nemoc v ČR nevyskytuje